

## **INFANCIA – 3 AÑOS DE EDAD**

- Problemas físicos (resfriados frecuentes, diarrea)
- gritos excesivo y irritabilidad
- problemas durmiendo
- retrasos en el desarrollo (no suben peso, no comen)
- ansiedad, tristeza, llanto frecuente, retiro emocional

## **3 – 7 AÑOS DE EDAD**

- desarrollo retrasado de lenguaje
- regresión a un comportamiento infantil, como chuparse el dedo
- dificultad llevándose bien con otros (niños)
- hostilidad y agresión
- comportamiento desafiante /rebelde y destructivo
- aferrarse a una persona
- temor
- culparse/ sentirse culpable

## **7 – 13 AÑOS DE EDAD**

- baja autoestima
- sentimientos conflictivos hacia el abusador
- aumento de agresión con sus compañeros, hermanos y padres
- vergüenza (negar la violencia en el hogar)
- comportamiento delincuente (robar, pelear, usar drogas)

## **13 – 18 AÑOS DE EDAD**

- patrones de culpar a otros por su comportamiento, especialmente a los padres
- altos niveles de enojo y ansiedad
- creencia inapropiada de que la violencia puede ser una respuesta a los conflictos
- comportamiento de protector hacia la víctima

- violencia contra la víctima
- sentido de responsabilidad por el cuidado de hermanos menores
- irse del hogar
- patrones de ausencias frecuentes a la escuela
- problemas de abuso de drogas o otras sustancias
- comportamiento promiscuo

## **EFFECTOS ADICIONALES – GRUPOS DE TODAS LAS EDADES**

- aumento de necesidades emocionales
- dificultad para adaptarse a la escuela
- fobias escolares (gran temor de dejar sola a la víctima)
- problemas somáticos (asma, úlceras pépticas, dolores de cabeza crónicos, calambres abdominales)
- trastornos alimentarios
- patrones de aumento de engaños (mentir en exceso, robar, hacer trampa)
- inclinación a mutilar o matar animales
- inhabilidad de confiar y desarrollar relaciones
- poca tolerancia a la frustración
- comportamiento autodestructivo, auto mutilación
- recuerdos de todos los detalles de abuso
- culpar a la víctima por el abuso, le presiona para hacer que las cosas mejoren
- baja imagen sexual
- baja autoestima
- orinarse en la cama